



**FICHA TECNICA
ANDILUFEN 50 EC**

FICHA TECNICA	
	ANDILUFEN 50 EC
Tipo	Insecticida
Uso	Agrícola
(Composición Garantizada) Ingrediente Activo	Lufenuron.....50 g/litro (RS) -1 - [2,5-dichloro - 4 - (1,1,2,3,3,3 - hexafluoropropoxy)phenyl] - 3-(2,6-difluronenzoyl)urea
Grupo químico	Benzamidas - Benzoylurea
Reg.ICA	Nº 697
Información General	ANDILUFEN 50 EC es un insecticida selectivo, que controla la larva del insecto plaga que pertenece al orden Lepidóptera, ANDILUFEN 50 EC actúa inhibiendo la síntesis de quitina.
Categoría Toxicológica	III Ligeramente peligroso/CUIDADO
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"	



**FICHA TECNICA
ANDILUFEN 50 EC**

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS Y OBSERVACIONES	P.R	P.C
MAIZ	Gusano Cogollero de maíz (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	350 cm ³ por hectárea	24 h	35 días

P.C: Periodo de carencia (intervalo de seguridad (días) entre la ultima aplicación y la cosecha).

P.R. Periodo de reingreso al área tratada

FRECUENCIA Y APLICACIÓN	Hacer las aplicaciones cuando se observen las primeras larvas presentes en el cultivo, y las larvas tengan de un primer a un tercer instar y si los niveles de infestación son altos repetir la aplicación.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	ANDILUFEN 50 EC es formulado como concentrado emulsionable, para realizar la preparación de la mezcla agregue la cantidad recomendada del producto al volumen de agua requerido y agite hasta obtener una solución homogénea. No deben guardarse las mezclas hasta otro día.
EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA	El volumen de mezcla a aplicar varía de conformidad con el equipo aspersor que se utilice, siendo se recomienda hacer una calibración previa a la aplicación. Los volúmenes de agua varían entre 200 y 400 litros de agua dependiendo el estado de desarrollo del cultivo.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD	Se recomienda que las mezclas con otros productos se experimenten previamente en pequeña escala. ANDILUFEN 50 EC no es fitotóxico al cultivo para el cual se recomienda, al igual que la dosis y frecuencia de aplicación dadas en esta etiqueta.



**FICHA TECNICA
ANDILUFEN 50 EC**

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS
AUXILIOS**

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA". En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

NO INDUZCA AL VÓMITO.

No lleve nada a la boca de una persona que esté inconsciente.

Lleve a la persona a un sitio con buena aireación.

EMERGENCIAS

Cisproquim: 24 horas Servicio Gratuito

Bogotá: 2886012.

Fuera de Bogotá:01-8000-916012

TOXICOLOGICAS:

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.



**FICHA TECNICA
ANDILUFEN 50 EC**

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

ANDINA DE NEGOCIOS S.A (ANDINESA)

Carrera 100 N°.11-90 Holguines Trade Center, Torre Valle del Lili/Oficina.418
Tel: 310-42-97/Fax: 310-43-01
Cali-Colombia

**TELÉFONO DE EMERGENCIA
CISPROQUIM 24 horas**

-Fuera de Bogotá: 01 8000-916012.
-Bogotá: 2886012