



FUNGICIDA AGRÍCOLA  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)  
Registro Nacional ICA No. 1106  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO

Azoxystrobin..... 200 g/L  
Tebuconazole .....125 g/L  
Ingredientes aditivos: ..... c.s.p. 1 Litro

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**IMPERIO** es un fungicida con acción sistémica y translaminar, preventivo y curativo. La acción combinada de sus ingredientes activos le permite actuar sobre una alta gama de hongos patógenos, en especial del orden Ascomycetos. El azoxystrobin es un methoxy-acrylato (derivado de las estrobirulinas) que posee actividad preventiva sistémica en una amplia gama de patógenos incluyendo oomycetos. Este impide la respiración fúngica en el complejo III; citocromo bc1, Ubiquinol -oxidasa, sitio Qo. El tebuconazol inhibe la biosíntesis de esteroides (ergosterol) en la desmetilación C14.

### TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS L/Ha	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
ARROZ ( <i>Oryza sativa</i> L.)	Anublo de la vaina ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	0.5	35	12
	Mancha parda ( <i>Helminthosporium oryzae</i> )	0.4		
ROSA ( <i>Rosa</i> sp)	Mildeo polvoso ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	1.5 (1.25 cc/L de agua)	N.A.	
CLAVEL ( <i>Dianthus caryophyllus</i> )	Mancha anillada ( <i>Cladosporium echinulatum</i> )	0.6 (0.6 cc/L de agua)	N.A.	
TOMATE ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Alternaria ( <i>Alternaria solani</i> )	0.25	7	
CEBOLLA ( <i>Allium cepa</i> )	Alternaria ( <i>Alternaria porri</i> )	0.3	14	

P.C. Periodo de carencia: N.A. No aplica. P.R. Periodo de reingreso.



### FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar **IMPERIO** en forma preventiva o con el comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 15 días. En cultivos de rosa realizar máximo tres (3) aplicaciones durante el ciclo del cultivo. Realizar las aspersiones dirigidas al patio de infección. Intercalar con fungicidas de diferente modo de acción.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



FUNGICIDA AGRÍCOLA  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)  
Registro Nacional ICA No. 1106  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



**anasac**  
COLOMBIA

# **Imperio**

## MODO DE APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que se va a utilizar, agregar la dosis requerida de **IMPERIO** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

## EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

## COMPATIBILIDAD



No recomendable mezclar con otro plaguicida o fertilizante. La compañía no se responsabiliza por mezclas no recomendadas en esta etiqueta.

## EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

**IMPERIO** se puede aplicar con los equipos convencionales. Para óptima distribución, utilizar boquillas de cono hueco y aplicar un volumen de 1200 litros de agua por hectárea. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para las plantas si se siguen las instrucciones de uso.



## ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.

Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,  
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:  
Línea 01 8000 916012  
(fuera de Bogotá)  
o en Bogotá al teléfono (091) 2886012.  
Atención 24 horas.**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE  
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO  
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR  
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”  
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y  
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”  
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES  
LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN  
LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O  
PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE  
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA  
AUTORIDAD LOCAL.**

## PRESENTACIONES

250cc - 1L - 4L - 20L

