

# FICHA TÉCNICA

## SKEL 250 EC

Actualización: 08/02/2023



**Fungicida de uso agrícola**  
**Titular: QUÍMICOS OMA S.A.**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Tipo de formulación:</b>   | Concentrado emulsionable EC   |
| <b>Ingrediente activo:</b>    | Difenoconazol<br>3-chloro-4-((2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl 4-chlorophenyl ether |
| <b>Concentración:</b>         | 250 g/L   |
| <b>Ingredientes aditivos:</b> | c.s.p. 1 litro  |
| <b>Grupo químico:</b>         | Triazoles   |

**MODO DE ACCIÓN:** Fungicida de contacto y sistémico con actividad preventiva y curativa.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Inhibición de la biosíntesis del ergosterol de la membrana de la célula deteniendo el desarrollo del fitopatógeno.

**FITOTOXICIDAD:** No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

**COMPATIBILIDAD:** Se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad y compatibilidad de mezcla antes de su aplicación comercial.

### RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO            | BLANCO BIOLÓGICO  | DOSIS                 | P.R.    | P.C        |
|--------------------|---|-----------------------|---------|------------|
| CEBOLLA<br>(Bulbo) | <b>Alternaria</b><br>( <i>Alternaria porri</i> )                                    | <b>100 ml/ 200 L</b>  | 4 horas | 7 -14 días |
| CLAVEL             | <b>Mancha foliar anillada: Cladosporium</b><br>( <i>Heterosporium echinulatum</i> ) | <b>0,6 ml/ L</b>      | 4 horas | N.A.       |
| FRIJOL             | <b>Antracnosis</b><br>( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )                      | <b>166 ml / 200 L</b> | 4 horas | 14 días    |
| ROSAS              | <b>Mildeo polvoso</b><br>( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )                            | <b>0,6 ml/L</b>       | 4 horas | N.A.       |
| TOMATE             | <b>Tizón temprano</b><br>( <i>Alternaria solani</i> )                               | <b>100 ml/200 L</b>   | 4 horas | 7 días     |



## FICHA TÉCNICA SKEL 250 EC

**P.R.: Periodo de Reentrada (Reingreso):** Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. El valor PR contenido en la presente etiqueta fue calculado por evaluación del riesgo (método 2. Res. ICA 00011768)

**P.C.: Periodo de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**N.A.:** No aplica

**Lea la etiqueta antes de usar el producto.**

**Advertencia:** “Para aplicaciones aéreas y terrestres, se debe respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos de agua”  
No contamine las aguas.

**PRESENTACIONES: 100, 250 mililitros; 1 y 20 Litros**

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ.  
EN BOGOTÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2886012**



**Registro Nacional ICA No. PL0003062022**  
**Formulado, Distribuido y Comercializado por:**  
**QUIMICOS OMA S.A.**  
Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas (Cota) Km 1.3  
Parque Empresarial AEPI, Bodega 16  
PBX: 8985179 – E. Mail: [servicioalcliente@quimicosoma.com](mailto:servicioalcliente@quimicosoma.com)  
Cota (Cundinamarca), Colombia  
[www.quimicosoma.com](http://www.quimicosoma.com)